

この冬は、ワクチン接種・新型コロナ抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備を




新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。

感染が拡大する前の接種をご検討ください



- ・新型コロナワクチンの接種
新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします。
- ・インフルエンザワクチンの接種
65歳以上の方などの定期接種対象者で、接種を希望される方は早めの接種をお願いします。



発熱などの体調不良時にそなえて、
早めに購入しておきましょう

- ・新型コロナ抗原定性検査キット
- ・解熱鎮痛薬

(市販の解熱鎮痛薬について)



あわせて確認しておきましょう



(受診・相談センターについて)

- ・電話相談窓口などの連絡先
受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、「救急車利用マニュアル」の参照や#7119（救急要請相談）、#8000（こども医療相談）など
- その他、生活必需品なども用意しておきましょう。
(体温計・日持ちする食料(5~7日分)など)



(救急車利用マニュアルについて)



国が承認した新型コロナ
抗原定性検査キットを選びましょう

「研究用」ではなく国が承認した「医療用」もしくは「一般用」のキットを使用してください。



医療用



一般用



研究用



(医療用)



(一般用)

新型コロナウイルスの 重症化リスクの低い方へ

(高齢者、基礎疾患有する方、妊婦などと小学生以下の子ども以外の方)

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが
同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。

流行時は、発熱外来の予約が取りづらくなります。
重症化リスクの高い方を守るため、
健康フォローアップセンターをご活用ください。

喉の痛みや発熱などの症状が出たら…

まずはご自身で新型コロナ
抗原定性検査キットで検査してください。



「研究用」ではなく国が承認した「医療用」もしくは「一般用」のキットを使用してください。



医療用



一般用



研究用



(医療用)



(一般用)



陽性だった場合は、地域の健康フォローアップ
センターに登録して自宅療養をお願いします。

- 体調変化時には、健康フォローアップセンターにご連絡ください。
- 検査キットの結果が陰性でも新型コロナやインフルなどに感染している場合があります。感染拡大を防ぐため、体調不良が続くときは、自宅で療養をお願いします。



(健康フォローアップ
センターについて)



(受診・相談センターについて)



受診を迷った場合

電話相談窓口などをご利用ください。

受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、「救急車利用マニュアル」の
参照や#7119（救急要請相談）、#8000（こども医療相談）など



(救急車利用マニュアルについて)

症状が重いなど受診を希望する場合

受診・相談センターに相談し、

かかりつけ医・発熱外来の受診や電話診療・オンライン診療をご検討ください。

新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします

ひと、くらし、みらいのために

